# **Monovin B1**



# USO VETERINÁRIO IN.IFTÁVFI

#### Fórmula:

Cada 100 ml. contém:

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA: BOVINOS: ABATE - O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA

PARA O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS. LEITE - O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENCA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO

A vitamina B1, também chamada de tiamina, é essencial em algumas reacões metabólicas. Atua principalmente no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídeos, agindo diretamente na obtenção de fonte energética do organismo. Tem importante participação no controle de impulsos nervosos, na manutenção do apetite, no tônus muscular, no crescimento e na reprodução dos animais.

#### Indicações:

Indicado para a suplementação e tratamento de hipovitaminose (deficiência) de vitamina B1, em bovinos.

### Modo de usar:

Inietável, por via intramuscular.

#### Dosagem:

Bovinos adultos - de 3 a 5 mL/dia, durante 5 a 10 dias consecutivos.

Bezerros - de 1 a 2 mL/dia, durante 5 a 10 dias consecutivos.

As aplicações devem ser realizadas de acordo com a orientação do Médico Veterinário.

## Contraindicações:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

Não administrar o produto em fêmeas lactantes e prenhes.

Não administrar o produto em animais com menos de 2 meses de idade.

Evitar aplicar o produto concomitante com bloqueadores neuromusculares, com formulações antioxidantes compostas por sulfito de sódio e com soluções alcalinizantes.

Usar sempre agulhas e seringas descartáveis ou esterilizadas.

Fazer assepsia no local da aplicação.

Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula.

Para aplicação deste produto o Médico Veterinário deve realizar a avaliação clínica do animal

Este produto não substitui a necessidade de fornecer uma dieta equilibrada nos diferentes componentes nutricionais necessários à manutenção da condição de saúde dos animais.

Armazenar, transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e umidade.

Manter o produto em sua embalagem original. Não retirar a sua tampa, por se tratar de produto estéril.

Não armazenar junto com alimentos, rações e bebidas destinadas para consumo humano e de animais

Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Embora não se constitua um fator de risco para a saúde pública, embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o meio ambiente, em conformidade com a legislação local.

Após aberto o produto deve ser utilizado em até 30 dias.

#### Apresentação:

Precauções:

Frasco-ampola com 20 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de criancas e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária desde 24/10/1972 e registrado no SIPEAGRO sob o nº RJ 000335-2.000013.

Responsável Técnica: Dra. Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante: **LABORATÓRIO BRAVET LTDA.** 

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340 SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19