

Anestésico Bravet



USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de lidocaína	2,000 g
Adrenalina	0,002 g
Veículo q.s.p.	100,000 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 02 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Anestésico Bravet promove anestesia regional de início rápido por bloqueio reversível da condução nervosa no local de aplicação. O início de ação ocorre aproximadamente 5 minutos após a administração, com duração média de 1 a 2 horas, podendo variar conforme a dose, a técnica de aplicação e a vascularização do tecido. Contém lidocaína associada à adrenalina. A lidocaína, anestésico local do grupo das amidas, atua pelo bloqueio dos canais de sódio nas células nervosas, impedindo a condução dos impulsos nervosos e promovendo anestesia local reversível. A adrenalina atua como vasoconstritor, reduzindo a absorção sistêmica da lidocaína e prolongando o efeito anestésico local.

Indicações: Indicado para bloqueio epidural caudal, em bovinos. Facilita as manobras ginecológicas, os procedimentos cirúrgicos da região perineal e de rotina na clínica ginecológica e obstétrica, com o animal consciente e em estação.

Modo de usar e Dosagem: Recomenda-se o uso de **1 mL** (0,2 mg de cloridrato de lidocaína e 0,0002 mg de adrenalina/kg) a **4,5 mL** (0,90 mg de cloridrato de lidocaína e 0,0009 mg de adrenalina/kg) de **Anestésico Bravet para cada 100 kg** de peso corpóreo, através de injeção epidural, no espaço intercoccígeo, entre a primeira e a segunda vértebra coccígea (Co1-Co2).

O volume a ser administrado pode variar a critério do Médico Veterinário, de acordo com o porte do animal e o tipo de procedimento a ser realizado.

Contraindicações: Não utilizar em animais com hipersensibilidade aos princípios ativos da formulação. Não administrar em fêmeas lactantes ou prenhes. Não aplicar em fêmeas produtoras de leite destinado ao consumo humano. Não utilizar para procedimentos em extremidades, devido ao risco de necrose tecidual.

Interações medicamentosas: Usar com cautela em associação com tranquilizantes, sedativos ou outros fármacos depressores do sistema nervoso central, devido à possibilidade de potencialização dos efeitos. Bloqueadores beta-adrenérgicos (como metoprolol e propranolol), quando administrados concomitantemente com lidocaína, podem aumentar o risco de efeitos cardíacos e de toxicidade. Não misturar lidocaína com ampicilina, cefazolina, barbitúricos, dopamina, fenitoína, isoproterenol ou soluções alcalinas.

Precauções: Utilizar com cautela em animais com distúrbios cardiovasculares, hepáticos ou renais, choque, hipovolemia, depressão respiratória grave ou hipóxia acentuada, distúrbios de coagulação, septicemia ou infecção da pele no local de aplicação. Antes de administrar qualquer anestésico local, deve-se dispor de oxigênio, equipamentos e medicamentos de reanimação de forma adequada. Realizar antisepsia no local de aplicação e utilizar seringa e agulha estéreis, seguindo as boas práticas de assepsia. Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula. O produto deve ser aplicado somente por Médico Veterinário qualificado, após criteriosa avaliação clínica do animal. Armazenar, transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e umidade. Não remover a tampa, pois se trata de produto estéril. Não armazenar junto com alimentos, rações ou bebidas destinadas ao consumo humano ou animal. Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios ou demais corpos d'água. Não reutilizar as embalagens vazias. Embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o meio ambiente, em conformidade com a legislação local. Após aberto o produto deve ser utilizado em até 30 dias.

Toxicidade: Em caso de sobredosagem, suspender o tratamento. Convulsões podem ser tratadas com benzodiazepínicos, como diazepam; evitar o uso de pentobarbital. Depressão circulatoria deve ser tratada com terapia de fluidos, agentes hipertensivos e, se necessário, reanimação cardiopulmonar. Em caso de injeção intravascular acidental, sinais de toxicidade do sistema nervoso central podem ser controlados com anticonvulsivantes do grupo dos benzodiazepínicos.

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária desde 10/03/1986 e registrado no SIPEAGRO sob o nº RJ 000335-2.000028.

Responsável Técnica: Dra. Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA



Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19