

Lidovet



USO VETERINÁRIO

Anestésico local à base de lidocaína.

INJETÁVEL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cloridrato de lidocaína 2,00 g

Solução de Ringer q.s.p. 100,0 mL

Indicações:

Lidovet é um anestésico local sem vasoconstritor, indicado para bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, cães e gatos, nos casos de: cesarianas, castrações, descornas, manobras clínico-cirúrgicas, cirurgias de extremidades (membros, tetas, pênis, prepúcio), laparotomia exploratória, ruminotomia e como auxiliar na redução de prolapo.

Lidovet deve ser usado em anestesias superficiais de mucosa, infiltrativa, de condução ou bloqueio nervoso ou epidural. Como agente antiarrítmico, no tratamento de emergência de arritmias ventriculares, com aplicação endovenosa.

Modo de Usar:

Aplicação por via intradérmica, subcutânea, infiltração muscular, epidural e endovenosa.

Dosagem:

A dosagem de **Lidovet** dependerá da extensão da cirurgia, da espécie animal e do tipo de anestesia local pretendida pelo Médico Veterinário.

Posologia recomendada para alguns procedimentos, para solução a 2% de Lidocaína:

Bovinos: Analgesia epidural baixa: 4 mL de **Lidovet**. Analgesia epidural alta: 60 mL de **Lidovet**. Anestesia da parte inferior dos membros: colocar um torniquete em torno do membro, logo abaixo ou acima do jarrete, e aplicar por via endovenosa 10 a 20 mL em qualquer veia superficial abaixo do torniquete.

Equinos: Anestesia de nervo mandibular: 10 a 20 mL.

Suínos: Castração em animais jovens: 0,05 mL a 0,10 mL/kg de peso corpóreo, por infiltração do escroto.

Caprinos: Descorna: 2 mL de cada lado dos chifres, por via intradérmica. Anestesia dos membros: aplica-se um torniquete acima do cotovelo ou do jarrete e injeta-se por via endovenosa 3 a 4 mL do produto.

Ovino adulto: 8 a 12 mL, por via epidural. Anestesia espinhal (intratecal), 5 mL no espaço lombossacro. Dose máxima em ovelhas, em anestesias extensas: 0,5 mL/kg (10 mg/kg de peso corpóreo).

Cães e Gatos: Arritmia cardíaca: 2 mg/kg de peso corpóreo (0,10 mL/kg) a cada 20-30 minutos, por via endovenosa, lenta. Anestesia cranial e vertebral: 1 a 2 mL, por via epidural, para cães e gatos de porte médio (3,4 a 4,5 kg de peso corpóreo).

Cuidados importantes:

Além dos cuidados básicos de assepsia, tais como desinfecção do local de aplicação, o uso de seringa e agulha descartáveis ou esterilizadas e o emprego de anestésicos locais, exige-se conhecimentos clínicos de anatomia e fisiologia do animal para a obtenção de anestesia satisfatória e segura. Por isto, o trabalho deve ser realizado ou orientado pelo Médico Veterinário na determinação do local exato de aplicação, do volume a ser aplicado, da duração do efeito anestésico, da extensão da manobra clínico-cirúrgica e da escolha do tipo de anestesia local.

Apresentação: Frasco-ampola com 20 e 50 mL.

Conserver em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação obrigatória do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 5.989 em 02/06/97.

Responsável Técnica: Drª Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA