

# Diclofenaco Bravet



## USO VETERINÁRIO

### **Analgésico, Anti-inflamatório e Antipirético** INJETÁVEL

#### **Fórmula:**

Cada 100 mL contém:

Diclofenaco sódico ..... 5,0 g

Veículo q.s.p. .... 100,0 mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**  
**BOVINOS - ABATE:** O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

**LEITE:** O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 08 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

#### **Indicações:**

**Diclofenaco Bravet** é um potente anti-inflamatório, antipirético, analgésico não esteroide e não narcótico indicado no tratamento dos processos inflamatórios em geral, agudos e crônicos, dos bovinos. Acelera a recuperação dos animais medicados por eliminar a inflamação, reduzir a dor e promover a melhora dos sintomas e bem estar dos animais.

#### **Modo de usar:**

Injetável, pela via endovenosa e intramuscular.

#### **Dosagem:**

Dose terapêutica do Diclofenaco sódico: 1 mg/kg de peso corporal, equivalente a **1 mL para cada 50 kg de peso corporal**, a cada 24 horas, durante 3 a 5 dias consecutivos.

### **Interações Medicamentosas:**

Há relato de que a aplicação do Diclofenaco sódico, associada a anticoagulantes, pode provocar hemorragia, sendo necessário acompanhamento médico, para aplicação do medicamento. Podem ocorrer reações farmacológicas somadas, pelo uso do Diclofenaco sódico, associado a outros anti-inflamatórios não esteroides ou glucocorticoides.

### **Efeitos Adversos:**

A aplicação prolongada de Diclofenaco sódico pode provocar úlcera estomacal ou na mucosa do intestino, além de depressão da função renal e o aparecimento de edema ou exantema.

### **Precauções:**

Calcular corretamente a dose a ser aplicada.

A aplicação do produto deve ser feita com seringas e agulhas esterilizadas ou descartáveis, seguindo as normas para aplicação de injetáveis.

No caso de superdosagem acidental, aplicar tratamento sintomático relativo a irritação e hemorragia intestinal, hipotensão, insuficiência renal, respiratória ou convulsões. A absorção pode ser minimizada por lavagem gástrica e diurese forçada, eficazes na eliminação de agentes anti-inflamatórios não esteroides, graças a sua taxa de ligação proteica e ao metabolismo extensivo.

### **Contraindicações:**

Não aplicar o produto em animais portadores de grave disfunção renal, em animais com ulcerações gástricas ou intestinais e em animais hipersensíveis a droga.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 50 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.612 em 02/06/03.

Responsável Técnica: Dr<sup>a</sup> Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266



Proprietário e Fabricante:

**LABORATÓRIO BRAVET LTDA.**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

**SAC:** 0800 0251622 - [www.bravet.com.br](http://www.bravet.com.br) - CNPJ 42.486.076/0001-19