Dornil

USO VETERINÁRIO
ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO E ANTIESPASMÓDICO
INJETÁVEL

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Dipirona sódica ..... 50,00 g
Veículo q.s.p. ..... 100,00 mL

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS - ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Indicações:
Analgésico com ação antipirética e espasmolítica para o alívio de dores musculares, ósseas, articulares, viscerais, nas cólicas e nos estados febris de bovinos e cães. Produto não esteroide e não narcótico.

Modo de usar:
Injetável, por via intramuscular profunda ou endovenosa lenta.

Dosagem:
Bovinos (adultos): de 12 a 25 mL/aplicação.
Bezerros: 10 mL/aplicação.
Caninos: de 1 a 5 mL/aplicação.
As doses podem ser repetidas de 8 em 8 horas ou a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:
Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto. Não administrar o produto em fêmeas lactantes e prenhes. Injetar doses moderadas, em animais muito velhos, depauperados ou gravemente doentes. Não aplicar em animais portadores de insuficiência renal, cardíaca ou hepática. Evitar aplicar o produto concomitantemente com produtos à base de cloridrato de clorpromazina, fenobarbital, cimetidina, ciclosporina, anticoagulantes, fármacos anti-hipertensivos e inibidores da receptação seletiva de serotonina.

Precauções:
Usar sempre agulhas e seringas descartáveis ou esterilizadas. Fazer assepsia no local da aplicação. Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula. Para aplicação deste produto o Médico Veterinário deve realizar a avaliação clínica do animal. Armazenar, transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e humidade. Não retirar a sua tampa, por se tratar de produto estéril. Não reutilizar as embalagens vazias. Não armazenar junto com alimentos, rações e bebidas destinadas para consumo humano e de animais. Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d´água. Embora não se constitua um fator de risco para a saúde pública, embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o meio ambiente, em conformidade com a legislação local. Após aberto o produto deve ser utilizado em até 30 dias.

Apresentação:
Frasco-ampola com 50 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária desde 15/11/1987 e registrado no SIPEAGRO sob o n° RJ 000335-2.000029.
Responsável Técnica: Dra. Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ - n° 4.266.

BRAVET

Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIO BRAVET LTDA. INDÚSTRIA BRASILEIRA

GG

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340
SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19