Quinolon 50 mg Comprimidos



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Indicações:

Quinolón 50 mg Comprimidos é um antimicrobiano de ação bactericida, pertencente ao grupo das quinolonas, indicado para o tratamento de diversas infecções dos cães causadas pelos seguintes microrganismos:

Klebsiella pneumoniae. Pseudomonas aeruginosa. Proteus mirabilis. Staphylococcus

intermedius e Streptococcus canis.

Modo de Usar:

Administrar por via oral em cães, acompanhado ou não de alimentos.

Dosagem:

Administrar 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo (equivalente a 5 mg de enrofloxacino/kg de peso corpóreo) uma vez ao dia, por 5 dias consecutivos ou conforme orientação do Médico Veterinário.

Farmacocinética:

A enrofloxacino é rapidamente absorvida após administração oral. Possui largo volume de distribuição, além da baixa ligação com as proteínas plasmáticas. O pico máximo de concentração sérica das quindonas varia conforme a espécie animal. A excreção renal tubular ativa resulta em uma alta concentração urinária. O grau de biotransformação das quinolonas é bastante variável

Farmacodinâmica:

As quinolonas são antimicrobianos bactericidas e seu mecanismo de ação se dá através da interferência enzimática relacionada com a multiplicação bacteriana. A enzima responsável por esta atividade é a DNA girase que tem seu metabolismo alterado. Esta alteração impede o enrolamento da hélice de DNA numa forma superespiralada.

Contraindicações:

Não administrar o produto em fêmeas lactantes e prenhes, independente do tempo de gestação.

Não usar em cães de raças pequenas e médias durante a fase de crescimento, ou seja, entre 2 e 8 meses de idade. Nos cães de raças maiores o período contraindicado pode chegar até 18 meses.

Não administrar o produto em animais que tenham apresentado hipersensibilidade ao ativo

da formulação do produto. Não usar o produto concomitantemente com produtos que contenham em suas formulações

antiácidos, sucralfato, ferro, cálcio, zinco, manganês, teofilina e complexos vitamínicos. Ffeitos colaterais:

Em alguns casos, durante o tratamento, em animais hipersensíveis, podem ocorrer reações alérgicas, náuseas, vômitos, quadros de diarreia, elevação de transaminases, prurido, urticária, erosão das cartilagens nos animais em fase de crescimento, alterações no sistema nervoso central e distúrbios no desenvolvimento osteoarticular. Nestes casos, recomenda-se comunicar o Médico Veterinário com urgência, tomando-se a precaução de levar a embalagem e bula do produto.

Precauções:

Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula.

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Para a administração deste produto o Médico Veterinário deve realizar a avaliação clínica

do animal

Armazenar: transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e umidade

Manter o produto em sua embalagem original e retirar o comprimido do blister somente no momento de sua utilização

Não armazenar junto de alimentos, rações e bebidas destinadas para consumo humano e de animais

Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água.

As embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o mejo ambiente, em conformidade com a legislação local.

Não reutilizar as embalagens vazias do produto.

Apresentação: Cartucho com 10 comprimidos.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 20/11/98 e registrado no SIPEAGRO sob o nº RJ 000335-2.000004.

Responsável Técnica: Drª Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário: LABORATÓRIO BRAVET LTDA. INDÚSTRIA BRASILEIRA Fabricante: Vansil Indústria Comércio e Representação Ltda.

Rua João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP - CNPJ 50,472,547/0001-68

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340 SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19