

Mercepton Oral



USO VETERINÁRIO

Antitóxico

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Acetilmetionina	15,00 g
Cloreto de colina	10,00 g
Inositol	1,00 g
Nicotinamida	1,00 g
Pantotenato de cálcio	0,50 g
Riboflavina (Vit. B2)	0,05 g
Piridoxina (Vit. B6)	0,25 g
Cianocobalamina (Vit. B12)	0,005 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

Mercepton Oral associa em sua composição o Cloreto de colina e a Acetilmetionina, proporcionando índices terapêuticos muito mais elevados do que aqueles que poderiam ser observados com o uso destes ativos isoladamente. A ação sinérgica destes dois fármacos estimula a secreção biliar e a função secretora do pâncreas, determinando uma elevada capacidade de estimular o processo lipotrópico e de eliminação de toxinas do organismo.

Esta ação baseia-se no desdobramento de lipídios ou de outras substâncias quimicamente relacionadas por sua emulsificação pela bile e por ativação de suas lipases, prevenindo a possível infiltração de gordura no fígado. A veiculação de vitaminas e oligoelementos no produto permite uma melhor e mais rápida recuperação do animal, normalmente debilitado pela redução de ingestão de alimentos ou por ação direta do agente tóxico ingerido.

Indicações:

Cães e gatos:

Produto colagogo e colerético, utilizado como estimulante do processo digestivo e da eliminação de toxinas oriundas de alimentos deteriorados ou de plantas tóxicas acidentalmente ingeridas. É indicado para casos de intoxicações medicamentosas acidentais

como o uso excessivo de vermífugos, sulfas e outros antibióticos, assim como, qualquer outro tratamento prolongado que produza distúrbios digestivos entre seus efeitos colaterais. Recomenda-se ainda para intoxicações com produtos de limpeza domésticos (ceras líquidas ou querosene) ou industriais. A eficaz ação lipotrópica do **Mercepton Oral** torna este medicamento adequado para o tratamento de disfunções digestivas, hepatobiliares e pancreáticas.

Modo de usar:

Por via oral. A administração do produto deve ser feita por gotejamento direto na boca do animal ou com auxílio de uma seringa sem agulha. O produto também pode ser diluído em água, em leite ou ainda adicionado à alimentação.

Posologia:

Cães de pequeno porte e gatos:

- nos primeiros meses de vida - 20 gotas, 2 a 3 vezes ao dia;
- depois de 03 meses de idade - 30 gotas, 2 a 3 vezes ao dia.

Filhotes de cães de raça grande - 30 gotas, 2 a 3 vezes ao dia.

Cães de grande porte adultos - 35 a 70 gotas, 2 a 3 vezes ao dia.

O produto pode ser administrado diariamente até o desaparecimento dos sintomas ou de acordo com a orientação do Médico Veterinário.

Apresentação:

Frasco conta-gotas com 20 mL.

Conservar em local fresco, seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 0193 em 01/09/1972.

Responsável Técnica: Dr^a Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19