Polivin ADE



USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cada 100 mL contem.	
Vitamina A	25.000 g
Vitamina D ₃	
Vitamina E	
Veículo q.s.p.	

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE - O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O ABATE DE ANIMAIS TRATADOS.

LEITE: O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O CONSUMO DE LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

A vitamina A está envolvida em várias funções fisiológicas como a diferenciação celular do tecido epitelial, crescimento osteomuscular, desenvolvimento estrutural e qualitativo do tecido queratinizado, síntese hormonal, espermatogênese e desenvolvimento fetal. Além disso, tem importância para processos mais generalizados como visão, crescimento, hematopoises e imunidade.

À vitamina D é essencial para a absorção do cálcio. Tem como principal função manter o cálcio e fósforo em níveis que suportem a mineralização normal dos ossos e outras funções fisiológicas destes elementos.

A vitamina E tem funções antioxidantes, importância na sinalização celular, modulação da expressão gênica, agregação plaquetária e inibição de proliferação celular. Por sua função antioxidante, esta vitamina é capaz de proteger a bicamada lipídica das membranas celulares e componentes estruturais da musculatura esquelética, cardíaca e do sistema imune.

Indicações:

Indicado para os casos de suplementação e tratamento das deficiências de vitamina A, vitamina D e vitamina E, em bovinos.

A eficácia desse produto não foi avaliada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Modo de usar:

Injetável, por via intramuscular.

Dosagem:

Bovinos adultos: 10 mL para cada 150 kg, em dose única.

Bezerros: 5 mL para cada 150 kg, em dose única.

Nas aplicações de doses de mais de 10 mL, recomenda-se dividir a dose total e injetar.

em regiões diferentes do corpo do animal.

As aplicações devem ser realizadas de acordo com a orientação do Médico

As aplicações devem ser realizadas de acordo com a orientação do Médico Veterinário.

Contraindicações:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

Não administrar o produto em fêmeas lactantes e prenhes.

Não administrar o produto em animais com menos de 03 meses de idade.

Evitar a aplicação concomitante do produto com doses elevadas de corticosteroides e óleo mineral.

Precauções:

Usar sempre agulhas e seringas descartáveis ou esterilizadas.

Fazer assepsia no local da aplicação.

Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula.

Para aplicação deste produto, o Médico Veterinário deve realizar a avaliação clínica do animal

Este produto não substitui a necessidade de fornecer uma dieta equilibrada nos diflerentes componentes nutricionais necessários à manutenção da condição de saúde dos animais.

Armazenar, transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e umidade.

Manter o produto em sua embalagem original. Não retirar a sua tampa, por se tratar de produto estéril.

Não armazenar junto com alimentos, rações e bebidas destinadas para consumo humano e de animais.

Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d´água.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Embora não se constitua um fator de risco para a saúde pública, embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o meio ambiente, em conformidade com a legislação local.

Após aberto o produto deve ser utilizado em até 30 dias.

Apresentação: Frasco-ampola com 50 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de criancas e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

venda sob prescrição e apincação como me direitação do Medico Vetermano. Licenciado provisoriamente no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número 117/2024 em 07/05/2024.

Responsável Técnica: Dra. Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ nº 4.266.



BRAVET Proprietário e Fabricante:

LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASII FIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340