

CICLORVET POUR-ON

USO VETERINÁRIO

Carrapaticida, mosquicida e
bernicida para bovinos



Conteúdo: 1 Litro

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS**
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO
DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 24 HORAS APÓS
A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS
INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE
RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO
O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:
Cada 100 mL contém:
Cipermetrina 5,0 g; Clorpirifós 7,0 g; Butóxido de
piperonila 1,0 mL; Veículo q.s.p. 100,0 mL.

Indicações: CICLORVET POUR-ON é indicado para uso
tóxico (Pour-on), no combate aos seguintes ectoparasitas
que acometem os bovinos: Carrapatos do gênero
Bovicapillus microplus (adultos). Larvas de *Dermatobia
hominis* (berne). Moscas dos gêneros *Haematobia irritans*
(adultos) e *Dermatobia hominis* (adultos).

Forma de Aplicação e Dosagem: CICLORVET
POUR-ON é uma solução oleosa pronta para uso que
deve ser aplicada em toda linha dorsal do animal,
vertendo a dose separada no frasco dosador, do
pescoço até a anca do animal. Dose do produto por kg
de peso corpóreo: cipermetrina 5 mg/kg, clorpirifós 7
mg/kg e butóxido de piperonila 0,001 mL/kg. Cada 0,1
mL do produto equivale às respectivas doses por kg de
peso corpóreo. A dose de tratamento é de 0,1 mL por kg
de peso corpóreo ou conforme informações abaixo:

Até 100 Kg de peso corporal, aplicar 10 mL.
De 100 a 200 Kg de peso corporal, aplicar 20 mL.
De 200 a 300 Kg de peso corporal, aplicar 30 mL.
De 300 a 400 Kg de peso corporal, aplicar 40 mL.
De 400 a 500 Kg de peso corporal, aplicar 50 mL.
Acima de 500 Kg de peso corporal, aplicar 60 mL.

Intervalo entre doses: O intervalo entre as aplicações
varia de acordo com o programa adotado no controle
dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de
infestação e taxa de reinfestação do rebanho e a critério
do Médico Veterinário.

Contraindicações e Limitações de uso: Não aplicar
em animais recém nascidos, debilitados, exaustos,
estressados ou doentes. Não administrar em animais
com a pele lesionada. Não administrar em animais com
hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos do
produto. Não aplicar o produto nas horas de calor
intenso. Não tratar os animais quando há ameaça de
chuva. Não aplicar em fêmeas no terço final de
gestação.

Interações medicamentosas: A utilização do produto
simultaneamente a outros medicamentos à base de
organofosforados e carbamatos deve ser avaliada e
observada atentamente pelo Médico Veterinário, para
prevenir a ocorrência de intoxicações. Produtos que
ativam os receptores colinérgicos e relaxantes
musculares periféricos devem ser evitados quando se
fizer uso de organofosforados. Os tranquilizantes
fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos
organofosforados. A succinilcolina e outros agentes
bloqueadores neuromusculares podem potencializar os
efeitos nicotínicos dos organofosforados.

Precauções: Manter a embalagem fechada. Obedecer
às dosagens e recomendações para uso do produto.
Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas. Evitar
longo contato com a pele, mucosa e a inalação do
produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto e
não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do
produto. Não guardar junto de alimentos, bebidas,
medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
Lavar muito bem as mãos e a parte exposta do corpo
antes de comer e de beber e, após o trabalho com o
produto. Utilizar equipamentos de proteção individual
(luvas, macacão, óculos de proteção, gorro e máscara
contra gases tóxicos) no momento da aplicação do
produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Não

contaminar rios e outros cursos de água. Caso o
produto entre em contato com os olhos lavá-los
imediatamente com água abundante, durante 15
minutos. Caso ocorra intoxicação acidental proceder da
seguinte forma: retirar as roupas contaminadas e lavar
as partes atingidas do corpo com água e sabão. Em
casos de ingestão acidental não provocar vômito e não
oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Procurar
imediatamente atendimento médico, levando consigo a
embalagem do produto. Não diluir o produto em óleos.

Reações adversas: Na posologia indicada e sob
orientação do Médico Veterinário não devem ocorrer
intoxicações nas espécies para qual o produto é
indicado. Os piretroides possuem potente atividade
inseticida com baixa toxicidade em mamíferos,
geralmente são seguros, mas em caso de intoxicação
acidental podem causar alergia, náusea, vômito e dor de
cabeça. Os organofosforados, em caso de intoxicação
acidental, podem provocar, principalmente, os
seguintes efeitos tóxicos: letargia, anorexia, diarreia,
polaciúria, vômitos, salivação e tremores musculares.

Informações para uso médico: Evitar o contato do
produto com a pele e mucosas do corpo humano. No
caso de contatos acidentais, lavar as partes atingidas
várias vezes com água e sabão. Em casos de
intoxicação humana, procurar um médico levando
consigo a embalagem do produto. Cipermetrina: não
existe antídoto específico. O tratamento deve ser
sintomático. Clorpirifós: sulfato de atropina e
reativadores da colinesterase (contração ou PAM).
Butóxido de piperonila: não existe antídoto específico. O
tratamento deve ser sintomático.

Apresentação: Frasco dosador de 250 mL e 1 L e
bomba de 5 L.

Conservar as embalagens fechadas, em local fresco e
seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo
da luz solar e fora do alcance de crianças e animais
domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E
APLICAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO VETERINÁRIO.**



Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento sob o nº 9.699 em 22/08/2012.
Responsável Técnica: Drª Valéria Souza de Faria
CRMV-RJ nº 4.266.

Proprietário: LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

Rua Visconde de Santa Cruz, 276
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-940
SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br
CNPJ: 42.486.076/0001-19

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Fabricante: JOFADEL INDÚSTRIA FARMACÉUTICA S/A.
Av. Dr. José de Faria Vasconcelos, 100
CEP 37062-500 - Varginha - MG
CNPJ: 17.843.682/0001-70

PART:
FABR.: VIDE GRAVAÇÃO NO FRASCO.
VENÇ:



7 897614 100980