

Bociodo



USO VETERINÁRIO
INJETÁVEL – ORAL

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Iodo	0,50 g
Iodeto de sódio	5,00 g
Veículo q.s.p.	100,00 mL

O PRODUTO NÃO REQUER PERÍODO DE CARÊNCIA

Indicações:

Bociodo é indicado para suplementação e tratamento das deficiências relacionadas aos componentes da fórmula, em bovinos jovens e adultos.

Modo de usar:

Bociodo deve ser administrado pela via injetável, em aplicações intramusculares ou, pela via oral.

Dosagem:

Aplicação pela via intramuscular	Dose
Bovinos adultos	50 mL. Dividir a dose em 25 mL e aplicá-las em locais diferentes do corpo do animal. Repetir com 7 dias de intervalo, de acordo com o quadro clínico e a orientação do Médico Veterinário.
Bovinos jovens	15 mL. Dividir a dose em 7,5 mL e aplicá-las em locais diferentes do corpo do animal. Repetir com 7 dias de intervalo, de acordo com o quadro clínico e a orientação do Médico Veterinário.
Aplicação pela via oral	Dose
Bovinos adultos	20 mL. Diariamente, durante 07 dias, de acordo com o quadro clínico e a orientação do Médico Veterinário.
Bovinos jovens	10 mL. Diariamente, durante 07 dias, de acordo com o quadro clínico e a orientação do Médico Veterinário.

Em todos os casos, cabe ao Médico Veterinário determinar a duração do tratamento, bem como, nos casos de persistirem os motivos que ocasionaram a carência, recomendar uma posologia de manutenção, fração da terapêutica.

Contraindicações:

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos componentes do produto.

Precauções:

Usar sempre agulhas e seringas descartáveis ou esterilizadas.

Para a aplicação injetável, fazer assepsia no local da aplicação.

Antes de usar o produto, ler atentamente a sua bula.

Para aplicação deste produto, o Médico Veterinário deve realizar a avaliação clínica do animal.

O iodo é acumulativo, sendo observada toxicidade crônica em várias fontes deste mineral, quando administrado de forma incorreta e em doses maciças.

Este produto não substitui a necessidade de fornecer uma dieta equilibrada nos diferentes componentes nutricionais necessários à manutenção da condição de saúde dos animais.

Armazenar, transportar e distribuir o produto nas embalagens originais de venda, ao abrigo do calor e umidade.

Manter o produto em sua embalagem original. Somente retirar a tampa no momento do uso.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Não armazenar junto com alimentos, rações e bebidas destinadas para consumo humano e de animais.

Não lavar embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água.

Embora não se constitua um fator de risco para a saúde pública, embalagens vazias e restos do produto devem ser corretamente descartados, para não poluir o meio ambiente, em conformidade com a legislação local.

Após aberto o produto deve ser utilizado em até 07 dias.

Apresentação: Frasco-ampola com 100 mL.

Conservar em local fresco, seco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação conforme orientação do Médico Veterinário.

Licenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desde 29/03/77 e registrado no SIPEAGRO sob o n° RJ 000335-2.000002.

Responsável Técnica: Dr^a Valéria Souza de Faria - CRMV-RJ n° 4.266.



Proprietário e Fabricante:
LABORATÓRIO BRAVET LTDA.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Rua Visconde de Santa Cruz, 276 - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20950-340

SAC: 0800 0251622 - www.bravet.com.br - CNPJ 42.486.076/0001-19